

ISOLEMENT POUR LES PO ET LES CAS CONTACTS (V 05/2021)

LE PATIENT 0 :

	Durée d'isolement P0
P0 symptomatique	10 jours à compter du début des symptômes ① Si toujours symptomatique à cette date : reste isolé jusqu'à guérison (48h après disparition de la fièvre)
P0 asymptomatique	10 jours à compter de la date de prélèvement ① En cas de survenue de symptômes évocateurs de la Covid-19 : période d'isolement rallongée de 10 jours à partir de la date d'apparition des symptômes <u>par le médecin traitant</u>

Quelle que soit la situation, la fin d'isolement des patients 0 n'est pas conditionnée à la réalisation d'un second test.

LE CAS CONTACT HORS FOYER :

① Les cas contacts ne doivent pas utiliser les autotests antigéniques.

	Tous les Cas contact
1er test >>>	1er (Test antigénique) à réaliser : immédiatement. - Test positif : Devient P0 ⇒ isolement jusqu'à sa guérison (a minima 10 jours, et au plus tôt 48h après la disparition des symptômes de fièvre et d'éventuelles difficultés respiratoires). Si besoin d'arrêt de travail, la PFCT délivrera une prolongation d'arrêt. - Test négatif : Voir ci-dessous "2nd test"
2nd test >>>	2ème Test (RT-PCR/antigénique) à réaliser : - 7 jours à la date du dernier contact OU - 7 jours à la date de l'appel (si date dernier contact non connue) - Test positif : Devient P0 ⇒ isolement jusqu'à sa guérison (a minima 10 jours, et au plus tôt 48h après la disparition des symptômes de fièvre et d'éventuelles difficultés respiratoires). Si besoin d'arrêt de travail, la PFCT délivrera une prolongation d'arrêt. - Test négatif : levée de l'isolement.

Durée d'isolement : Date du dernier contact + 7 jours ou -7 jours à la date d'appel (si date dernier contact non connue)

LE CAS CONTACT FOYER :

	Tous les Cas contact (de P0 "classiques" + variant anglais, brésilien et sud-africain)
1er test >>>	Test de dépistage à réaliser immédiatement (test antigénique). - Test positif : Devient P0 ⇒ isolement jusqu'à sa guérison (a minima 10 jours, et au plus tôt 48h après la disparition des symptômes de fièvre et d'éventuelles difficultés respiratoires). - Test négatif : Voir ci-dessous "2nd test"
2nd test >>>	Test de dépistage (test RT-PCR/antigénique) à faire 7 jours après la guérison du patient zéro soit : -> Cas contact d'un P0 symptomatique : 17 jours à compter de la date début des symptômes du P0 -> Cas contact d'un P0 asymptomatique : 17 jours à compter de la date du prélèvement du P0 - Test positif : Devient P0 ⇒ isolement jusqu'à sa guérison (a minima 10 jours, et au plus tôt 48h après la disparition des symptômes de fièvre et d'éventuelles difficultés respiratoires). Si besoin d'arrêt de travail, la PFCT délivrera une prolongation d'arrêt. - Test négatif : levée de l'isolement.

Durée d'isolement :

-> **Cas contact d'un P0 symptomatique : 17 jours à compter du début des symptômes du P0**

-> **Cas contact d'un P0 asymptomatique : 17 jours à compter de la date du prélèvement du P0**

① **La levée d'isolement est conditionnée à l'obtention d'un résultat négatif au 2nd test.**

LES ENFANTS :

Test positif : enfant devient P0 => consulte son médecin traitant.

Cas contact foyer	Enfant de 6 ans et plus	<ul style="list-style-type: none">○ Cas contact foyer = 17 jours <p>① Test recommandé. si non réalisé : isolement de 24 jours (en l'absence de symptômes).</p>
	Enfant - 6 ans	Test non obligatoire mais conseillé : - > Si l'enfant a des symptômes, <input type="checkbox"/> - Si l'enfant est à risque de forme grave de Covid, <input type="checkbox"/> - Si une personne du foyer est à risque de forme grave du Covid. <ul style="list-style-type: none">○ Cas contact foyer = 17 jours
Cas contact hors foyer	Enfant + 6 ans	<p>7 jours d'isolement et test à réaliser par les parents à la fin de l'isolement de l'enfant</p> <p>① Test recommandé. si non réalisé : isolement de 14 jours (en l'absence de symptômes).</p>
	Enfant - 6 ans	Test non obligatoire mais conseillé : - <input type="checkbox"/> Si l'enfant a des symptômes, <input type="checkbox"/> - Si l'enfant est à risque de forme grave de Covid, <input type="checkbox"/> - Si une personne du foyer est à risque de forme grave du Covid. <p>Cas contact hors foyer = 7 jours d'isolement et test à réaliser par les parents à la fin de l'isolement de l'enfant</p>

DEPLACEMENT A L'ETRANGER :

Les voyageurs qui effectueraient un déplacement à l'étranger doivent s'engager après avoir réalisé un test avant leur retour sur le territoire, **à respecter un isolement de 7 jours** à leur arrivée et à effectuer un nouveau test 7 jours après leur arrivée.

Cas particulier, variant Indien

Des mesures particulières ont été prises pour les retours du Brésil, du Chili, de l'Argentine, de l'Afrique du Sud, de l'Inde et de la Guyane.

A l'arrivée sur le sol français, **les passagers réalisent un TAG** et doivent respecter une mesure d'isolement pour les TAG positifs ou **une mesure de quarantaine pour les TAG négatifs**.

Les passagers avec **un TAG positif intègre le dispositif de CT classique**.

Pour les passagers **avec un TAG négatif, une mesure de quarantaine de 10 jours est notifiée** aux passagers par arrêté préfectoral **avec pour consigne de réaliser un test à J9**.