



## Poser une poche à urine pédiatrique

- Faire boire le bébé si nécessaire
- Se laver les mains.
- Allonger le bébé sur le dos.
- Faire une toilette soignée de la vulve, du méat urinaire et du périnée ou du gland et du prépuce à l'aide de lingettes désinfectantes remises par le laboratoire ou à l'aide d'un savon antiseptique. Laisser sécher à l'air libre.
- Ouvrir le sachet. Détacher et jeter la découpe centrale de la poche et retirer le revêtement qui protège l'adhésif
- Pour les filles, l'ouverture du collecteur doit couvrir l'ensemble de la zone uro-génitale.
- Pour les garçons, le pénis doit être glissé dans le collecteur



- Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence.
- Surveiller l'arrivée des urines à intervalles réguliers
- Après recueil de l'urine, retirer le collecteur et plier en deux la surface adhésive avec précaution. Pour assurer l'étanchéité, coller l'adhésif face contre face et renforcer avec du sparadrap si nécessaire
- Mettre le collecteur ainsi scellé dans le flacon stérile (pot à coproculture) fourni par le laboratoire
- Identifier le flacon avec le nom et prénom de l'enfant et l'heure de prélèvement

Acheminer le prélèvement au laboratoire dans les plus brefs délais (<2H). Si nécessaire, les urines peuvent être conservées à +4° pour une durée maximale de 24H.

Remarque : le collecteur ne doit pas rester en place plus de 1 heure. Si après ce délai l'enfant n'a pas uriné ou si le collecteur est souillé par des matières fécales, remettre une poche neuve en respectant les préconisations inscrites plus haut.